

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
RİLEXİNE DC 375 Mg
Meme içi Süspansiyon
Kuru Dönem Veteriner Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beher tüp, 375 mg sefalekssin (benzatin formunda) ve کافی miktar yavaş salınım yapan baz içerir, beyaz- krem renkte yağlı bir süspansiyondur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

RİLEXİNE DC 375 Mg Meme içi Süspansiyon bileşimindeki %4.69 sefalekssin, 1. kuşak sefalosporin grubu bir antibakteriyeldir. Sefalekssin, duyarlı bakteriler üzerindeki bakterisid etkisini, bakteri hücre duvarı sentezini bozarak gösterir. Sefalekssin beta-laktamazlara karşı penisilinlerden daha dirençlidir. Bileşimindeki kademeli ve yavaş salınım sağlayan özel baz sayesinde ve benzatin tuzu nedeniyle en az 4 hafta süresince mastitis patojenlerine karşı etki gösterir.

Sefalekssin gram pozitif bakterilere karşı etkilidir. Ancak gram negatif organizmalara karşı kısmen aktiftir.

Bazı duyarlı organizmaların MIC (minimum inhibitör konsantrasyonu) değerleri:

- Staphylococcus aureus.....1.6 µg/ml
- Streptococcus agalactiae..... 0.4 µg/ml
- Streptococcus dysgalactiae..... 0.2 µg/ml
- Streptococcus uberis..... 0.4 µg/ml
- Escherichia coli..... 2.8 – 12.5 µg/ml

Sefalekssin, penisilinleri inaktive eden β-Laktamazlara karşı doğal dirençlidir. Ancak bazı sefalosporinazlar tarafından inaktive edilebilir.

Farmakokinetik özellikleri

Farmakokinetik veriler ilacın meme bezinden kana geçişinin oldukça az olduğunu göstermektedir. Sefaleksinin kuru dönem boyunca ve yavrulamayı takip eden 4 gün boyunca serumda tespit edilebilir konsantrasyonda olmaması antibiyotiğin memede kaldığını göstermektedir.

ENDİKASYONU / KULLANIM SAHASI

RİLEXİNE DC 375 Mg Meme içi Süspansiyon kuru dönemdeki ineklerde kuru dönem boyunca meme içindeki mevcut enfeksiyonların rutin tedavisinde ve profilaksisinde kullanılır:

- Subklinik mastitis tedavisi (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*).
- Yeni enfeksiyonların profilaksisinde.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

RİLEXİNE DC 375 Mg Meme içi Süspansiyonun uygulanmasından önce meme ucu ve çevresi antiseptikli mendil ile dezenfekte edilir. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, kuruya çıkarılan ineklerde, son sağımı takiben her meme lobuna 1 tüp uygulanır. Dağılımı hızlandırmak için memeye masaj yapılır. Uygulamadan önce tüpü iyice çalkalayınız. Tüpün kanülüne el sürmeyiniz ve kanülü hiçbir yere değdirmeyiniz.

İSTENMEYEN ETKİLER

RİLEXİNE DC 375 Mg Meme içi Süspansiyon, sefalosporinlere duyarlı olan hayvanlarda alerjik tepkimelere neden olabilir. Akut penisilin alerjisi olan hayvanlar, sefaleksine karşı da hassastır.

KONTRENDİKASYONU

Penisilin ve sefalosporinlere aşırı duyarlı olan hayvanlarda kontrendikedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aminoglikozitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Diğer sefalosporinler ile çapraz duyarlılık vardır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve ambalajında saklayınız.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Bekleme süresi et ve sakatat için 4 gün, süt için kuru dönemin 42 gün veya daha uzun olması durumunda doğumdan 12 saat sonra, kuru dönemin 42 günden kısa olması durumunda uygulamadan 42.5 gün sonradır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25°C) ve güneş ışığından uzakta saklandığında raf ömrü 24 aydır. Açılmış olan tüp bitirilmelidir, kalan miktar tekrar kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Beyaz opak, sert, yüksek dansiteli polietilenden yapılmış, hava geçirmez kapak ile kapatılmış 8 g ürün içeren plastik enjektör şeklindedir. 4,12 ve 60 enjektörlük paketler halinde karton kutularda, antiseptik mendil ile takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.10.2019

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 18.03.2015 – 15/006

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ADRESİ:

Virbac Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.

Zekeriyaköy Mah. Kilyos Cad. No: 272 A6/D5 Sarıyer 34450 İstanbul TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ve ADRESİ:

HAUPT PHARMA LATINA

S.S. 156 deı Monti Lepini- Km. 47,600

04100 Borgo San Michele-Latina, İTALYA
